


Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklar



Afet sonrası nüfusun yer değiştirmesi, temiz su, sağlık hizmetine ulaşamaması gibi nedenlerle enfeksiyon etkenlerine bağlı bulaşıcı hastalık salgınları görülebilir.

1

Depremi takip eden dönemde; **İlk 3-4 gün** deri ve yumuşak doku enfeksiyonları **4 ile 30 gün arası** solunum yolu enfeksiyonları, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar, **30 günden sonra** vektör kaynaklı enfeksiyonlar görülmektedir.



2

Afet sonrası

Toplu yaşam alanları ve kamplarda kişiler arası yakın temasa bağlı olarak yetersiz havalandırma ve uygunsuz hijyen koşulları ve çevre koşullarının uygun olmaması solunum, sindirim ve cilt enfeksiyonlarına neden olabilir.



3

Solunum sistemi enfeksiyonları

Barınma amacıyla oluşturulan kamplarda, kalabalık ortamlar ve çevre koşullarının uygun olmaması sonucu damlacık yoluyla yayılabilen enfeksiyonlar görülebilir.



4

Su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar

Depremi takip eden günlerde özellikle kontamine su ve gıdaların neden olduğu ishalleri hastalıklar ve enfeksiyonlar görülmektedir.



5

Vektör kaynaklı enfeksiyonlar

Vektör ve parazitlerin bölgesel dağılımı iyi bilinmelidir çünkü afetlerde çevre koşullarının bozulması ve kötü hijyen koşulları vektör kaynaklı enfeksiyonlara neden olmaktadır.



6

Genel Önlemler



Temiz su temini
İyi sanitizasyon
Su ve gıda hijyeni
Aşılama
Vektör kontrolü
Kişisel hijyen (el yıkama)
Profilaktik tedaviler
Katı atık yönetimi
Sağlık eğitimi



7

Topluma yönelik

Afete maruz kalan bireylere, enfeksiyon bulaş yolları ve kontrol önlemleri anlatılmalıdır. Afet bölgesinde koşullara uygun veri (bilgi) toplama sistemi kurulmalı ve veriler analiz edilmelidir.

